

REPORT MENSILE

RETE LOCALE TERMOVALORIZZATORE DI PARMA

Ottobre 2017

Stazioni locali e Laboratorio Mobile posizionato nel Comune di
Torrile, in via Allende.

Relazione tecnica a cura di:
Sezione di Parma - Servizio Sistemi Ambientali
Unità Qualità – Rete Monitoraggio Aria
Claudia Pironi, Beatrice Zani, Teresa Concari, Giancarlo Pinto

Documento scaricabile all'indirizzo: www.arpae.it/

Report mensile sulla qualità dell'aria

provincia: **Parma**
periodo di riferimento: **01/10/2017 - 31/10/2017**

Stazioni di monitoraggio




Figura 1: Stazioni di monitoraggio.

Il laboratorio mobile è stato posizionato dal 1 al 2 ottobre a Mezzano Inferiore e dal 4 al 31 ottobre a Torrile.

nome	Comune	tipo stazione	tipo zona
Saragat	Colorno	Fondo	Suburbana
Montebello	Parma	Traffico	Urbana
Cittadella	Parma	Fondo	Urbana
Malcantone	Mezzani	Industriale	Rurale
Bogolese	Sorbolo	Industriale	Suburbana
Lm-Pr-Paip	Torrile	Industriale	
Paradigna	Parma	Industriale	Suburbana

Tabella 1: Stazioni di monitoraggio. Le stazioni riportate con sfondo grigio, in questa tabella e nelle seguenti, non appartengono alla rete regionale di monitoraggio. Tali stazioni sono state collocate per valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria di specifiche fonti di emissione come impianti industriali ed altre infrastrutture. I dati da esse rilevati sono quindi indicativi della sola realtà locale monitorata.

inquinante	descrizione	elaborazione	soglia	superamenti consentiti
PM10	Valore limite giornaliero	Media giornaliera	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	35 in un anno
PM2.5	Valore limite su base annua	Media giornaliera	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-
NO ₂	Valore limite orario	Media oraria	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	18 in un anno
O ₃	Soglia d'informazione	Media oraria	180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-
	Soglia d'allarme	Media oraria	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-
	Valore obiettivo	Massima delle medie mobili su 8 ore	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	75 in 3 anni
CO	Valore limite	Massima delle medie mobili su 8 ore	10 mg/m^3	-
SO ₂	Valore limite giornaliero	Media giornaliera	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3 in un anno
SO ₂	Valore limite orario	Media oraria	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	24 in un anno
C ₆ H ₆	Valore limite su base annua	Media giornaliera	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-

Tabella 2: Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs. 155/2010).

PM10

Il particolato è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa. Il termine PM10 identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 μm (1 μm = 1 millesimo di millimetro). Le particelle PM10 penetrano in profondità nei nostri polmoni. Il loro effetto sulla nostra salute e sull'ambiente dipende dalla loro composizione.

Alcune particelle vengono emesse direttamente nell'atmosfera, ma la maggior parte si formano come risultato di reazioni chimiche che coinvolgono i gas precursori (anidride solforosa, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili). Gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico.

stazione	% dati validi	min	max	media	50° %	90° %	95° %	98° %	superamenti
Cittadella	100	11	118	57	53	90	107	113	17
Montebello	100	12	113	55	52	85	105	109	16
Saragat	100	11	100	52	51	80	87	94	16
Bogolese	100	8	103	50	47	83	90	98	14
Lm-Pr-Paip	97	14	102	58	61	87	90	96	20
Malcantone	100	9	98	52	50	80	85	91	15
Paradigna	100	9	103	51	47	81	89	96	15

Tabella 3: PM10, statistiche del periodo.

stazione	media 01/01/2017- 31/10/2017	superamenti 01/01/2017- 31/10/2017	media 01/01/2016- 31/10/2016	superamenti 01/01/2016- 31/10/2016
Cittadella	34	51	26	17
Montebello	33	51	26	14
Saragat	31	50	24	17
Bogolese	30	46	24	14
Lm-Pr-Paip	33	53	27	17
Malcantone	31	46	25	15
Paradigna	31	48	25	16

Tabella 4: PM10, confronto con l'anno precedente.




Figura 2: Concentrazioni giornaliere di PM10.

PM2.5

Il termine PM2.5 identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai $2.5 \mu m$ ($1 \mu m = 1$ millesimo di millimetro). L'inquinamento da particolato fine è composto da particelle solide e liquide così piccole che penetrano in profondità nei nostri polmoni ed entrano anche nel nostro flusso sanguigno. Il particolato è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa.

Alcune particelle vengono emesse direttamente nell'atmosfera, ma la maggior parte si formano come risultato di reazioni chimiche che coinvolgono i gas precursori (anidride solforosa, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili). Gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico.

stazione	% dati validi	min	max	media	50° %	90° %	95° %	98° %
Cittadella	100	< 5	78	38	36	66	68	72
Saragat	100	7	68	36	37	58	61	64
Bogolese	100	5	69	34	32	56	62	65
Lm-Pr-Paip	97	6	58	34	36	53	57	58
Malcantone	100	6	66	35	35	55	59	62
Paradigna	100	5	69	34	31	56	64	67

Tabella 5: PM2.5, statistiche del periodo.

stazione	media 01/01/2017- 31/10/2017	media 01/01/2016- 31/10/2016
Cittadella	22	17
Saragat	21	18
Bogolese	20	17
Lm-Pr-Paip	20	18
Malcantone	21	17
Paradigna	21	17

Tabella 6: PM2.5, confronto con l'anno precedente.




Figura 3: Concentrazioni giornaliere di PM2.5.

Biossido di azoto

Il biossido di azoto (NO_2) è un gas reattivo, di colore bruno e di odore acre e pungente. L'esposizione a breve termine all' NO_2 può causare diminuzione della funzionalità polmonare, specie nei gruppi più sensibili della popolazione, mentre l'esposizione a lungo termine può causare effetti più gravi come un aumento della suscettibilità alle infezioni respiratorie. Inoltre determina effetti negativi sugli ecosistemi, contribuendo all'acidificazione e all'eutrofizzazione. È precursore dell'ozono, del PM10 e del PM2,5.

Le maggiori sorgenti di NO_2 sono i processi di combustione ad alta temperatura (come quelli che avvengono nei motori delle automobili – specie diesel – o nelle centrali termoelettriche).

stazione	% dati validi	min	max	media	50° %	90° %	95° %	98° %	superamenti
Cittadella	100	< 12	105	31	27	57	67	77	0
Montebello	96	< 12	137	45	39	76	98	118	0
Saragat	95	< 12	68	21	19	38	44	49	0
Bogolese	100	< 12	115	35	33	65	77	88	0
Lm-Pr-Paip	97	< 12	137	37	34	60	72	87	0
Malcantone	100	< 12	70	22	19	38	44	52	0
Paradigna	100	< 12	116	36	34	65	77	94	0

Tabella 7: Biossido di azoto, statistiche del periodo.

stazione	media 01/01/2017- 31/10/2017	media 01/01/2016- 31/10/2016
Cittadella	23	21
Montebello	34	32
Saragat	19	18
Bogolese	27	25
Lm-Pr-Paip	24	23
Malcantone	17	16
Paradigna	31	31

Tabella 8: NO_2 , confronto con l'anno precedente.




Figura 4: Concentrazioni massime giornaliere di NO_2 .

Benzene

Il benzene (C_6H_6) è una sostanza chimica liquida e incolore dal caratteristico odore aromatico pungente. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) classifica il benzene come sostanza cancerogena di classe I.

La maggior parte del benzene oggi prodotto (85%) trova impiego nell'industria chimica, per produrre plastiche, resine, detergenti, pesticidi, intermedi per l'industria farmaceutica, vernici, collanti, inchiostri e adesivi. Il benzene è inoltre contenuto nelle benzine.

stazione	% dati validi	min	max	media	50° %	90° %	95° %	98° %	superamenti
Montebello	87	< 0.5	6.9	1.4	1	2.7	3.7	5	0
Lm-Pr-Paip	96	< 0.5	4.2	0.9	0.9	1.5	1.8	2	0
Paradigna	97	< 0.5	3.4	0.8	0.7	1.3	1.6	1.9	0

Tabella 9: Benzene, statistiche del periodo.

stazione	media 01/01/2017- 31/10/2017	media 01/01/2016- 31/10/2016
Montebello	1.1	1.0
Lm-Pr-Paip	0.7	0.7
Paradigna	0.6	0.6

Tabella 10: C_6H_6 , confronto con l'anno precedente.




Figura 5: Concentrazioni medie giornaliere di benzene.

Biossido di zolfo

L'assenza di colore, l'odore acre e pungente e l'elevata reattività a contatto con l'acqua sono le caratteristiche principali degli ossidi di zolfo, genericamente indicati come SOx. Le emissioni di SOx derivano dalla combustione di materiali in cui sia presente zolfo quale contaminante (gasolio, nafta, carbone, legna) e dalle eruzioni vulcaniche.

stazione	% dati validi	min	max	media	50° %	90° %	95° %	98° %	superamenti
Lm-Pr-Paip	96	< 14	< 14	< 14	< 14	< 14	< 14	< 14	0

Tabella 11: Biossido di zolfo, statistiche del periodo.

stazione	media 01/01/2017- 31/10/2017	media 01/01/2016- 31/10/2016
Lm-Pr-Paip	4	4

Tabella 12: SO₂, confronto con l'anno precedente.




Figura 6: Concentrazioni massime giornaliere di biossido di zolfo.




Figura 7: Massimi medie giornaliere di biossido di zolfo.

Hg

Il mercurio deriva dalle emissioni dei vulcani, dalla volatilizzazione del metallo dalla crosta terrestre e per una buona metà da fonti umane, come gli inceneritori di rifiuti urbani e dalle emissioni di alcune industrie.

Viene assorbito attraverso i polmoni per via inalatoria e si deposita all'interno delle cellule, in particolare nel sistema nervoso centrale e nel rene.

Per questo inquinante la normativa relativa alla qualità dell'aria non indica alcun limite. Come riferimento si possono considerare i valori di letteratura relativi a stazioni di tipo urbano/residenziale elaborati nella relazione tecnica "Piano di Monitoraggio della Qualità dell'Aria per la determinazione di microinquinanti organici ed inorganici nell'ambito della Valutazione di Rischio nel Sito di Interesse Nazionale del Comune di Brescia relativi all'estate 2007 ed all'inverno 2008".

(<http://sito.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/tutelaambiente/Pagine/piano-monitoraggio-qualit%C3%A0-aria.aspx>)

stazione	% dati validi	min	max	media	50° %	90° %	95° %	98° %
Laboratorio mobile	100%	0.9	13.9	1.7	1.7	2.1	2.3	2.5
Parma-Paradigna	100%	1.2	3.6	1.9	1.9	2.4	2.6	2.8
Colorno-Saragat	95%	1.1	7.6	2.0	2.0	2.6	2.7	2.9

Tabella 13: Hg, statistiche del periodo.

stazione	Media 01/01/2017 - 31/10/2017	Media 01/01/2016 - 31/10/2016
Laboratorio mobile	1.9	1.9
Parma-Paradigna	1.8	1.9
Colorno-Saragat	2	1.9

Tabella 14: Hg, confronto con l'anno precedente.




Figura 8: Hg, massimi giornalieri

NH3

L'ammoniaca deriva da attività agricole (allevamenti zootecnici e fertilizzanti) e, in minor misura, traffico e attività industriali. Può provocare irritazione alle vie respiratorie, acidificazione ed eutrofizzazione dell'ambiente.

Per questo inquinante la normativa relativa alla qualità dell'aria non indica alcun limite. Come riferimento si possono considerare i valori di letteratura indicati da Arpa Lombardia nel "progetto Parfil".

stazione	% dati validi	min	media	max	50°	90°	95°	98°
Laboratorio Mobile	100%	11	37	155	33	60	69	79

Tabella 15: NH3, statistiche del periodo.

stazione	Media 01/01/2017 - 31/10/2017	Media 01/01/2016 - 31/10/2016
Laboratorio mobile	20	19

Tabella 16: NH3, confronto con l'anno precedente.




Figura 9: NH3, massimi giornalieri.

PM1, PM2.5, PM10 – stime andamenti orari




Figura 10: *PM1, andamento orario giornaliero.*




Figura 11: *PM2.5, andamento orario giornaliero.*




Figura 12: *PM10, andamento orario giornaliero.*