

Rete regionale qualità dell'aria

certificata UNI EN-ISO 9001:2015

Report mensile qualità dell'aria

Provincia: **Rimini**

Periodo di riferimento: **maggio 2023**

05/06/2023



Stazioni di monitoraggio

Figura 1: Stazioni di monitoraggio.

nome	Comune	tipo stazione	tipo zona
San Clemente	San Clemente	Fondo	Rurale
Marecchia	Rimini	Fondo	Urbana
Flaminia	Rimini	Traffico	Urbana
San Leo	San Leo	Fondo	Rurale
Verucchio	Verucchio	Fondo	Suburbana

Tabella 1: Stazioni di monitoraggio.

inquinante	descrizione	elaborazione	soglia	superamenti consentiti
PM10	Valore limite giornaliero	Media giornaliera	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	35 in un anno
PM2.5	Valore limite su base annua	Media giornaliera	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-
NO ₂	Valore limite orario	Media oraria	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	18 in un anno
O ₃	Soglia d'informazione	Media oraria	180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-
	Soglia d'allarme	Media oraria	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-
	Valore obiettivo	Massima delle medie mobili su 8 ore	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	75 in 3 anni
CO	Valore limite	Massima delle medie mobili su 8 ore	10 mg/m^3	-
SO ₂	Valore limite giornaliero	Media giornaliera	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3 in un anno
SO ₂	Valore limite orario	Media oraria	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	24 in un anno
C ₆ H ₆	Valore limite su base annua	Media giornaliera	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-

Tabella 2: Limiti di riferimento per gli inquinanti monitorati (D.Lgs. 155/2010).

PM10

Il particolato è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa. Il termine PM10 identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 μm (1 μm = 1 millesimo di millimetro). Le particelle PM10 penetrano in profondità nei nostri polmoni. Il loro effetto sulla nostra salute e sull'ambiente dipende dalla loro composizione.

Alcune particelle vengono emesse direttamente nell'atmosfera, ma la maggior parte si formano come risultato di reazioni chimiche che coinvolgono i gas precursori (anidride solforosa, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili). Gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico.

stazione	% dati validi	min	max	media	50° %	90° %	95° %	98° %	superamenti
Flaminia	100	6	27	18	18	22	24	26	0
Marecchia	94	4	24	15	16	21	22	23	0
San Leo	100	< 3	17	9	9	15	16	16	0
Verucchio	84	4	21	14	14	19	20	21	0

Tabella 3: PM10, statistiche del periodo.

stazione	media 01/01/2023- 31/05/2023	superamenti 01/01/2023- 31/05/2023	media 01/01/2022- 31/05/2022	superamenti 01/01/2022- 31/05/2022
Flaminia	27	17	33	25
Marecchia	24	11	30	14
San Leo	10	0	15	0
Verucchio	17	1	21	2

Tabella 4: PM10, confronto con l'anno precedente.

Figura 2: Concentrazioni giornaliere di PM10.

PM2.5

Il termine PM2.5 identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai $2.5 \mu m$ ($1 \mu m = 1$ millesimo di millimetro). L'inquinamento da particolato fine è composto da particelle solide e liquide così piccole che penetrano in profondità nei nostri polmoni ed entrano anche nel nostro flusso sanguigno. Il particolato è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa.

Alcune particelle vengono emesse direttamente nell'atmosfera, ma la maggior parte si formano come risultato di reazioni chimiche che coinvolgono i gas precursori (anidride solforosa, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili). Gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico.

stazione	% dati validi	min	max	media	50° %	90° %	95° %	98° %
Marecchia	90	< 3	21	10	10	15	18	20
San Clemente	100	< 3	12	7	7	11	12	12

Tabella 5: PM2.5, statistiche del periodo.

stazione	media	
	01/01/2023-31/05/2023	01/01/2022-31/05/2022
Marecchia	16	19
San Clemente	10	14

Tabella 6: PM2.5, confronto con l'anno precedente.

Figura 3: Concentrazioni giornaliere di PM2.5.

Ozono

L'ozono (O_3) è una forma speciale e altamente reattiva di ossigeno. Nella stratosfera l'ozono ci protegge dalle radiazioni ultraviolette. Ma nello strato più basso dell'atmosfera – la troposfera – l'ozono è dannoso per la salute e l'ambiente. Riduce la capacità fotosintetica delle piante, ne indebolisce la crescita e la riproduzione. Nel corpo umano provoca infiammazioni ai polmoni e ai bronchi. Per le persone che già soffrono di disturbi cardiovascolari o respiratori, picchi di ozono possono essere debilitanti e persino fatali.

L'ozono si forma come risultato di reazioni chimiche complesse tra gas precursori (ossidi di azoto, composti organici volatili COV, monossido di carbonio). Tali precursori sono emessi prevalentemente dalle combustioni (industria, traffico), dai solventi e dall'evaporazione di carburanti. I COV hanno anche importanti sorgenti naturali (in Emilia-Romagna circa il 20%). Le reazioni chimiche che producono ozono sono catalizzate dalla radiazione solare, di conseguenza questo inquinante è tipicamente estivo.

stazione	% dati validi	min	max	media	50° %	90° %	95° %	98° %	sup. (ore)	180	sup. (giorni)	120
Marecchia	100	< 8	134	63	63	107	115	119	0		0	
San Clemente	100	21	96	54	55	77	82	86	0		0	
San Leo	100	22	110	62	63	88	94	101	0		0	
Verucchio	93	16	135	70	69	109	117	124	0		3	

Tabella 7: Ozono, statistiche del periodo.

stazione	media 01/01/2023-31/05/2023	sup. (ore) 01/01/2023-31/05/2023	180	sup. (giorni) 01/01/2023-31/05/2023	120	media 01/01/2022-31/05/2022	sup. (ore) 01/01/2022-31/05/2022	180	sup. (giorni) 01/01/2022-31/05/2022	120
Marecchia	45	0		0		45	0		0	
San Clemente	51	0		0		68	0		1	
San Leo	60	0		0		59	0		0	
Verucchio	57	0		3		57	0		6	

Tabella 8: O_3 , confronto con l'anno precedente.

Figura 4: Concentrazioni massime giornaliere di ozono.

Figura 5: Massimi giornalieri della media di 8 ore di ozono.

Biossido di azoto

Il biossido di azoto (NO_2) è un gas reattivo, di colore bruno e di odore acre e pungente. L'esposizione a breve termine all' NO_2 può causare diminuzione della funzionalità polmonare, specie nei gruppi più sensibili della popolazione, mentre l'esposizione a lungo termine può causare effetti più gravi come un aumento della suscettibilità alle infezioni respiratorie. Inoltre determina effetti negativi sugli ecosistemi, contribuendo all'acidificazione e all'eutrofizzazione. È precursore dell'ozono, del PM10 e del PM2,5.

Le maggiori sorgenti di NO_2 sono i processi di combustione ad alta temperatura (come quelli che avvengono nei motori delle automobili – specie diesel – o nelle centrali termoelettriche).

stazione	% dati validi	min	max	media	50° %	90° %	95° %	98° %	superamenti
Flaminia	100	< 8	78	29	28	47	54	61	0
Marecchia	100	< 8	46	11	8	22	26	33	0
San Clemente	100	< 8	25	< 8	< 8	9	11	13	0
San Leo	100	< 8	8	< 8	< 8	< 8	< 8	< 8	0
Verucchio	93	< 8	25	< 8	< 8	9	11	13	0

Tabella 9: Biossido di azoto, statistiche del periodo.

stazione	media	
	01/01/2023-31/05/2023	01/01/2022-31/05/2022
Flaminia	37	39
Marecchia	17	18
San Clemente	7	11
San Leo	3	6
Verucchio	9	11

Tabella 10: NO_2 , confronto con l'anno precedente.

Figura 6: Concentrazioni massime giornaliere di NO_2 .

Benzene

Il benzene (C_6H_6) è una sostanza chimica liquida e incolore dal caratteristico odore aromatico pungente. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) classifica il benzene come sostanza cancerogena di classe I.

La maggior parte del benzene oggi prodotto (85%) trova impiego nell'industria chimica, per produrre plastiche, resine, detersivi, pesticidi, intermedi per l'industria farmaceutica, vernici, collanti, inchiostri e adesivi. Il benzene è inoltre contenuto nelle benzine.

stazione	% dati validi	min	max	media	50° %	90° %	95° %	98° %	superamenti
Flaminia	100	< 0.1	8.8	1.2	1.1	2	2.3	2.5	0

Tabella 11: Benzene, statistiche del periodo.

stazione	media 01/01/2023- 31/05/2023	media 01/01/2022- 31/05/2022
Flaminia	1.7	1.6

Tabella 12: C_6H_6 , confronto con l'anno precedente.

Figura 7: Concentrazioni medie giornaliere di benzene.

Monossido di carbonio

Il monossido di carbonio (CO), incolore e inodore, è un prodotto derivante dalla combustione. A bassissime dosi il CO non è pericoloso, mentre a livelli di concentrazione nel sangue pari al 10-20% il soggetto avverte i primi sintomi, quali lieve emicrania e stanchezza.

La principale sorgente di CO è il traffico veicolare (circa l'80% a livello mondiale), in particolare i veicoli a benzina. L'emissione è connessa alle condizioni di funzionamento del motore: si registrano concentrazioni più elevate con motore al minimo e in fase di decelerazione. L'evoluzione delle tecnologie ha determinato una significativa riduzione delle emissioni.

stazione	% dati validi	min	max	media	50° %	90° %	95° %	98° %	superamenti
Flaminia	100	0.4	1.1	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0

Tabella 13: Monossido di carbonio, statistiche del periodo.

stazione	media	
	01/01/2023-31/05/2023	01/01/2022-31/05/2022
Flaminia	0.7	0.7

Tabella 14: CO, confronto con l'anno precedente.

Figura 8: Massimi giornalieri della media di 8 ore di monossido di carbonio.