

Bollettino AgroMeteorologico Settimanale

n. 23/2025 del 9 giugno 2025

2 giugno 2025 - 8 giugno 2025

Diario meteorologico: temperature sopra la norma e precipitazioni scarse

La settimana è stata caratterizzata da precipitazioni molto limitate e localizzate nelle aree centrali, osservate nei giorni 4 e 5 giugno. Le cumulate settimanali presentano valori esigui, che solo in aree molto limitate superano i 5 mm totali.

Le temperature medie si sono mantenute sempre al di sopra della normale variabilità climatica (2001-2020) con valori di anomalia simili sia per le minime, sia per le massime. Le anomalie settimanali delle temperature massime hanno raggiunto valori superiori a 4 °C in ampie aree nella parte centro-orientale della regione e picchi oltre 5 °C localmente in Romagna e sui rilievi modenesi. Il valore più alto di temperatura, pari a 33,6 °C è stato rilevato il giorno 7 a Mirabello (FE, 10 m s.l.m.). Le minime hanno assunto valori sempre superiori a 20 °C nei principali centri urbani, un valore massimo di 23,3 °C il giorno 8 a Bologna, e anomalie leggermente più contenute rispetto alle massime, poco superiori a 4 °C solo in aree limitate della Romagna e del Bolognese.

Disponibilità idriche: <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/siccita>

Il protrarsi di condizioni di scarsa piovosità ha determinato lievi anomalie negative nella precipitazione cumulata da inizio anno nelle aree collinari e pedecollinari centro-orientali fino al -20% rispetto al clima 2001-2020. Le anomalie assumono valori nettamente positivi sui crinali centro-occidentali e lievemente positivi nella pianura ferrarese. Il bilancio idroclimatico da inizio anno si presenta positivo sui rilievi (fino a oltre 900 mm) e nullo o negativo in pianura (tra 0 e -150 mm). La maggior parte della pianura ha valori superiori a -50 mm, ed il massimo di -150 mm è circoscritto ad un'area tra le province di Reggio Emilia e Modena.

Le sezioni centro-orientali del Po hanno presentato portate superiori alla media mensile storica nella seconda parte della settimana. Le portate degli altri corsi d'acqua regionali, ad eccezione del Panaro e Secchia, sono prossime ai minimi storici.

Contenuto idrico del suolo:

Il contenuto di acqua disponibile nel suolo è superiore o simile alla norma climatica (2001-2020) nelle aree orientali e, localmente, nelle pianure centro-occidentali, attorno al 20° percentile nella fascia collinare e sul crinale. Il deficit idrico del primo metro di suolo presenta i valori minimi (20 mm circa) sui rilievi e massimi locali di 200 mm in pianura. Il deficit assume valori positivi anche nei primi 25 cm di suolo (tra 5 e 60 mm).

