

Bollettino AgroMeteorologico Settimanale

n. 29/2025 del 21 luglio 2025

14 luglio 2025 - 20 luglio 2025

Diario meteorologico: precipitazioni scarse e temperature nella norma.

La settimana è stata caratterizzata da rovesci a carattere temporalesco, concentrati nelle giornate del 15, 16 e 20 luglio. Il 15 luglio e il 20 luglio, temporali localizzati hanno interessato, con quantitativi modesti, i rilievi appenninici e la pianura piacentina. Il 16 luglio, il passaggio di un fronte temporalesco verso nord sull'Appennino bolognese ha portato a valori significativi di cumulate orarie, il cui valore massimo è stato di 42,6 mm a Porretta Terme (BO). L'anomalia delle precipitazioni settimanali rispetto al 2001-2020 si attesta tra 0 e -10 mm, ad eccezione delle aree interessate dai fenomeni più intensi del 16 luglio, dove ha valori positivi compresi tra +10 e +20 mm. La temperatura media settimanale regionale è stata di 24,9 °C, nella norma climatica 2001-2020, con valori leggermente crescenti durante la settimana ma senza anomalie significative. La giornata più calda è stata il 15 luglio quando la temperatura giornaliera media regionale ha superato di +1 °C il 75° percentile del clima 2001-2020. Le anomalie delle temperature massime e minime sono state positive ovunque con valore medio di +1 °C rispetto al clima 2001-2020.

Disponibilità idriche: <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/siccita>

Il bilancio idroclimatico settimanale è ovunque negativo con valori compresi tra -25 e -50 mm.

L'anomalia delle precipitazioni da inizio anno rispetto al clima 2001-2020 mostra anomalie negative nelle aree di pianura centro-occidentali e del riminese, contenute entro -20%, e anomalie positive altrove; i valori massimi raggiungono +50% sul crinale centro-occidentale. Il bilancio idroclimatico da inizio anno assume la stessa struttura con valori negativi che si estendono in pianura tra -200 e -350 mm.

La portata del fiume Po è in diminuzione con valori leggermente superiori ai minimi storici mensili su tutte le sezioni.

Contenuto idrico del suolo:

La frazione di acqua disponibile nel suolo presenta valori molto bassi nella maggior parte della pianura e della prima collina, mentre le frazioni più alte si riscontrano sul crinale centro-occidentale. Questi valori si attestano mediamente intorno al 50° percentile, localmente leggermente superiori, mentre ampie porzioni della pianura ferrarese, bolognese e modenese e la collina centro-orientale si collocano tra il 10° e il 30° percentile.

